

(受診医療機関用)

突然の受診で恐れ入ります。下記のような経緯で受傷しました。ご多忙中のところ誠に恐れ入りますが、ご高診お願いします。

何かご不明の点がありましたらお手数お掛けいたしますが、ご一報賜りますようお願い申し上げます。

団 体 名 :
担 当 者 名 :
担 当 者 連 絡 先 :

氏 名 :

(ふりがな) :

生 年 月 日 :

住 所 :

連 絡 先 :

家族または保護者への連絡の有無 : (有 ・ 無)

その連絡先 :

受 傷 時 間 : 年 月 日 時 分頃

最 終 摂 食 : 年 月 日 時 分頃

意識消失の有無 : (有 ・ 無)

居合わせた医療関係者の有無 : (有 ・ 無)

受 傷 機 転 :

<受傷時意識状態> (○をつける)

●Japan Coma Scale : JCS

(3-3-9度方式)

I(1桁)刺激しなくても覚醒している状態
0: 意識清明
1: 大体意識清明だが、いまひとつはっきりしない
2: 時、人、場所がわからない(見当識障害)
3: 自分の名前、生年月日が言えない
II(2桁)刺激をすると覚醒する状態 —刺激をやめると眠り込む—
10: ふつうの呼びかけで容易に開眼する
20: 大きな声またはからだをゆさぶることにより開眼する
30: 痛み刺激を加えつつ呼びかけをくり返すと、かろうじて開眼する
III(3桁)刺激しても覚醒しない状態
100: 痛み刺激に対し、払いのけるような動作をする
200: 痛み刺激で少し手足を動かしたり、顔をしかめる
300: 痛み刺激にまったく反応しない

< 分後意識状態 >

●Japan Coma Scale : JCS

(3-3-9度方式)

I(1桁)刺激しなくても覚醒している状態
0: 意識清明
1: 大体意識清明だが、いまひとつはっきりしない
2: 時、人、場所がわからない(見当識障害)
3: 自分の名前、生年月日が言えない
II(2桁)刺激をすると覚醒する状態 —刺激をやめると眠り込む—
10: ふつうの呼びかけで容易に開眼する
20: 大きな声またはからだをゆさぶることにより開眼する
30: 痛み刺激を加えつつ呼びかけをくり返すと、かろうじて開眼する
III(3桁)刺激しても覚醒しない状態
100: 痛み刺激に対し、払いのけるような動作をする
200: 痛み刺激で少し手足を動かしたり、顔をしかめる
300: 痛み刺激にまったく反応しない

(競技団体用)

突然の受診で恐れ入ります。下記のような経緯で受傷しました。ご多忙中のところ誠に恐れ入りますが、ご高診お願いします。

何かご不明の点がありましたらお手数お掛けいたしますが、ご一報賜りますようお願い申し上げます。

団 体 名 :
担 当 者 名 :
担 当 者 連 絡 先 :

氏 名 :

(ふりがな) :

生 年 月 日 :

住 所 :

連 絡 先 :

家族または保護者への連絡の有無 : (有 ・ 無)

その連絡先 :

受 傷 時 間 : 年 月 日 時 分頃

最 終 摂 食 : 年 月 日 時 分頃

意識消失の有無 : (有 ・ 無)

居合わせた医療関係者の有無 : (有 ・ 無)

受 傷 機 転 :

<受傷時意識状態> (○をつける)

●Japan Coma Scale : JCS

(3-3-9度方式)

I(1桁)刺激しなくても覚醒している状態
0: 意識清明
1: 大体意識清明だが、いまひとつはつきりしない
2: 時、人、場所がわからない(見当識障害)
3: 自分の名前、生年月日が言えない
II(2桁)刺激をすると覚醒する状態 —刺激をやめると眠り込む—
10: ふつうの呼びかけで容易に開眼する
20: 大きな声またはからだをゆさぶることにより開眼する
30: 痛み刺激を加えつつ呼びかけをくり返すと、かろうじて開眼する
III(3桁)刺激しても覚醒しない状態
100: 痛み刺激に対し、払いのけるような動作をする
200: 痛み刺激で少し手足を動かしたり、顔をしかめる
300: 痛み刺激にまったく反応しない

< 分後意識状態 >

●Japan Coma Scale : JCS

(3-3-9度方式)

I(1桁)刺激しなくても覚醒している状態
0: 意識清明
1: 大体意識清明だが、いまひとつはつきりしない
2: 時、人、場所がわからない(見当識障害)
3: 自分の名前、生年月日が言えない
II(2桁)刺激をすると覚醒する状態 —刺激をやめると眠り込む—
10: ふつうの呼びかけで容易に開眼する
20: 大きな声またはからだをゆさぶることにより開眼する
30: 痛み刺激を加えつつ呼びかけをくり返すと、かろうじて開眼する
III(3桁)刺激しても覚醒しない状態
100: 痛み刺激に対し、払いのけるような動作をする
200: 痛み刺激で少し手足を動かしたり、顔をしかめる
300: 痛み刺激にまったく反応しない